

PROTOCOLE
UTILISATION DU MASQUE CHIRURGICAL SUR
VICTIME POTENTIELLEMENT CONTAGIEUSE

Identification :	Version : A	Date d'application :	Page : 1/3
PL.G / 045		Septembre 2005	

OBJET : Ce protocole a pour but de définir le mode d'utilisation du masque chirurgicale sur victime potentiellement infecté

DESTINATAIRES POUR APPLICATION :

- Sapeurs -pompiers
- Médecins et Infirmiers SP

DESTINATAIRES POUR INFORMATION :

- Direction
- Service Formation
- Médecin Chef

DEFINITIONS :

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES :





DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Fiche technique Plan lutte contre "pandémie grippale" diffusion mai 2005
- Fiche technique fabricant
- Directive européenne 93/42/CEE
- Fiche pratique sécurité INRS ED 105 : appareil de protection respiratoire et métiers de santé
- Comité technique national des infections nosocomiales, société française d'hygiène hospitalière septique, recommandation pour les établissements de soins, paris 1998
- Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de france (section maladies transmissibles) relatif au choix d'un masque de protection contre la tuberculose en milieu de soins (14 mars 2003)

SOMMAIRE :

Tableau des Modifications ----Page 2/3
 I – UTILISATION ---Page 3/3

RESPONSABILITES :

REDACTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEURS (Valide et approuve)	
<i>(Toute personne demandant la rédaction d'un document)</i>	<i>(toute personne dans le domaine de compétence)</i>		
Service /Fonction : PUI	Service /Fonction : PUI		
Nom : COLLADO Eric POURRET Didier	Nom : COLLADO Eric POURRET Didier	Chef du Groupement S.S.S.M	Directeur Départemental
Date : 09/09/05	Date : 09/09/05	Date : 12/09/05	Date : 20/10/05
Visa : 	Visa : 	Visa : 	Visa :  Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
			Colonel Bernard ROMATIF



PROCOLE

UTILISATION DU MASQUE CHIRURGICAL SUR VICTIME POTENTIELLEMENT CONTAGIEUSE

Identification :

PL.G /045

Version : A

Date d'application

Septembre 2005

Page : 2/3

TABLEAU DES MODIFICATIONS

Raison de la modification (règlementation, changement d'organisation...)	Date	Version et Page	Paragraphes modifiés

Identification :

PL.G /045

Version : A

Date d'application

Septembre 2005

Page : 3/3

<i>Rédigé par</i>	<i>Vérifié par</i>	<i>Validé par</i>	<i>Validé par</i>
Pharmacien Cdt E. COLLADO Médecin 2ème classe D. POURRET	Pharmacien Cdt E. COLLADO Médecin 2ème classe D. POURRET	Médecin 2ème classe D. POURRET	Colonel B. ROMATIF

OBJET

Ce protocole a pour but de définir le mode d'utilisation du masque de protection chirurgical

Ce masque est porté par la victime prise en charge pour éviter la propulsion de gouttelettes infectées par la victime vers le milieu ambiant.

I – UTILISATION :

- se protéger avec le masque FFP2 (PL.G/044)
- mettre des gants de protection (latex ou nitrile si allergique)
- sortir le masque chirurgical de l'emballage
- appliquer le masque sur le visage de la victime
- lier les liens bas derrière la nuque
- ajuster le masque en tirant en haut et en bas pour déplier le masque
- lier les liens haut derrière la tête
- ôter la paire de gants
- jeter la paire de gant dans le sac à DASRI
- utiliser le gel hydroalcoolique (cf protocole PL.HY/005) présent dans le VSAV
- remettre une nouvelle paire de gants

Remarque :

- la victime conservera son masque pendant toute la durée de la prise en charge
- dans la situation où la victime potentiellement infectée nécessiterait l'administration d'oxygène, les lunettes seraient préférées au masque de haute concentration. Ceci afin de pouvoir toujours appliquer le masque chirurgical par dessus les lunettes.